

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата
КАРНИЛАНД®

Регистрационный номер:

Торговое наименование Карниланд®

Международное непатентованное или группировочное наименование Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Ландыша травы настойка + Левоментола раствор в ментилизовалерате + Нитроглицерин

Лекарственная форма капли подъязычные

Состав

Нитроглицерин раствор спиртовой 1 % - 2,17 мл
эквивалентно 17,8 мг нитроглицерина

Левоментола раствор в ментилизовалерате (валидол) - 4,35 мл

Ландыша травы настойка (ландыша настойка) - 21,7 мл

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка (валерианы настойка) - 21,7 мл

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 95 % - до 100 мл

Описание Прозрачная жидкость темного желто-зелёного цвета с запахом валерианы и ментола.

Фармакотерапевтическая группа Средства для лечения заболеваний сердца; вазодилаторы для лечения заболеваний сердца; органические нитраты.

Код АТХ: C01DA52

Фармакологические свойства Седативное и спазмолитическое сосудорасширяющее, улучшающее кровоснабжение и метаболизм миокарда. Состав по действию аналогичен прописи, известной как капли Вотчала.

Показания к применению Купирование приступов стенокардии, кардиалгия.

Противопоказания Гиперчувствительность к валериане лекарственной корневищ с корнями настойке, ландыша травы настойке, левоментолу раствору в ментилизовалерате, нитроглицерину или к любому из вспомогательных веществ.

Повышенная чувствительность к нитратам, шок, коллапс, одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (силденафил, варденафил или тадалафил), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью Внутричерепная гипертензия, состояния, сопровождающиеся снижением давления заполнения левого желудочка, в т.ч. тампонада сердца, изолированный митральный стеноз, констриктивный перикардит, неконтролируемая гиповолемия, сердечная недостаточность при нормальном или низком давлении в легочной артерии, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, черепно-мозговая травма (недавно перенесенная), токсический отек легких, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, закрытоугольная форма глаукомы с высоким внутриглазным давлением; тяжелая анемия, гипертиреоз, нарушение мозгового кровообращения, шок, артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление меньше 90 мм рт. ст.), алкоголизм.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применять препарат при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы Под язык. 10-15 капель принимают с небольшим количеством жидкости или наносят на кусок сахара и держат во рту (под языком), не проглатывая до полного всасывания. С учётом индивидуальной чувствительности и переносимости ра-

зовая доза может составлять от 5 до 25 капель. Увеличение разовой дозы с 15 до 25 капель возможно по рекомендации врача. Частота и длительность применения капель зависят от частоты, интенсивности приступов стенокардии, эффективности и переносимости. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, "нитратная" головная боль, тахикардия, гиперемия, ощущение жара. Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота. Неблагоприятные побочные реакции со стороны нервной системы: головокружение. При наличии побочных эффектов рекомендуется уменьшить дозу препарата для однократного приема. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка Симптомы: выраженное снижение артериального давления с ортостатической дисрегуляцией, рефлекторная тахикардия, головная боль; может развиваться астенция; головокружение, повышенная сонливость, чувство жара, тошнота, рвота. При подозрении на передозировку необходимо немедленно обратиться за врачебной помощью. До прихода врача пострадавшего следует уложить, приподняв ноги.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Одновременное применение с вазодилататорами, гипотензивными средствами (ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, бета-адреноблокаторами, блокаторами "медленных" кальциевых каналов), прокаинамидом, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (силденафил, варденафил или тадалафил), а также этанолом, усиливает гипотензивный эффект. Одновременное применение с сапроптерином повышает риск развития артериальной гипотензии.

Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания На фоне применения препарата Карниланд® возможно значительное снижение артериального давления и появление головокружения при резком переходе в положение «стоя» из положения "лежа" или "сидя"; при употреблении алкоголя, при выполнении физических упражнений и при жаркой погоде. К препарату Карниланд®, как и ко всем органическим нитратам, при частом применении развивается привыкание, при этом требуется повышение дозы. Препарат содержит 75,0 об. % этанола. В 1 капле препарата содержится 0,019 г абсолютного этилового спирта. Максимальная разовая доза препарата (25 капель) содержит 0,48 г абсолютного этилового спирта, что эквивалентно 12 мл пива или 5,1 мл вина. Максимальная суточная доза (102 капли) содержит 1,96 г абсолютного этилового спирта, что эквивалентно 49,2 мл пива или 20,7 мл вина. Вреден для пациентов с алкоголизмом. Необходимо учитывать беременным и кормящим грудью женщинам, и таким группам высокого риска, как пациенты с заболеваниями печени и эпилепсией.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска Капли подъязычные. 25 мл, 50 мл во флаконы-капельницы темного стек-

ла, укупоренные пробками-капельницами и навинчиваемыми пластмассовыми крышками. 1 флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения ООО «Медикал лизинг-консалтинг»

Предприятие-производитель/

Организация, принимающая претензии

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2

Тел./факс (4822) 44-41-19